

GRANUFINK®

Prosta forte

Wirkstoff:

Dickextrakt aus Kürbissamen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

WAS IN DIESER PACKUNGSBEILAGE STEHT:

1. Was ist GRANUFINK® Prosta forte und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von GRANUFINK® Prosta forte beachten?
3. Wie ist GRANUFINK® Prosta forte einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist GRANUFINK® Prosta forte aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST GRANUFINK® PROSTA FORTE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

GRANUFINK® Prosta forte enthält einen Dickextrakt aus Kürbissamen.

Anwendungsgebiete:

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel. Zur Anwendung bei Männern mit Beschwerden der unteren Harnwege, die infolge einer überaktiven Blase oder einer gutartigen Vergrößerung der Prostata auftreten (z. B. Harndrang, häufiges Wasserlassen tagsüber und nachts, unvollständige Blasenentleerung und Schwierigkeiten beim Wasserlassen). Die gutartige Vergrößerung der Prostata muss vom Arzt diagnostiziert sein. Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für die genannten Anwendungsgebiete registriert ist. Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON GRANUFINK® PROSTA FORTE BEACHTEN?

GRANUFINK® Prosta forte darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen den Wirkstoff bzw. andere kürbisähnliche Pflanzen oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie GRANUFINK® Prosta forte einnehmen. Dieses Arzneimittel lindert nur die Beschwerden, die durch eine vergrößerte Prostata verursacht werden, macht die Vergrößerung selbst jedoch nicht rückgängig. Sie sollten daher regelmäßig zum Arzt gehen.

Sie müssen unverzüglich Ihren Arzt aufsuchen, wenn während der Anwendung dieses Produktes Folgendes eintritt:

- wenn Sie Blut in Ihrem Urin sehen,
- wenn Sie Fieber bekommen,
- wenn Sie krampfartige Beschwerden oder Schmerzen beim Wasserlassen bekommen,
- wenn bei Ihnen Harnverhalten auftritt.

Allergische Reaktionen können nicht ausgeschlossen werden. Brechen Sie in diesem Fall die Behandlung ab und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Kinder und Jugendliche

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wird die Einnahme von GRANUFINK® Prosta forte nicht empfohlen, da Beschwerden der unteren Harnwege bei dieser Altersgruppe eine ärztliche Überwachung erfordern.

Einnahme von GRANUFINK® Prosta forte zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

GRANUFINK® Prosta forte ist zur Anwendung bei Frauen nicht indiziert, daher keine Angaben.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Zu GRANUFINK® Prosta forte sind keine Beeinträchtigungen der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen bekannt.

3. WIE IST GRANUFINK® PROSTA FORTE EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene ab 18 Jahren:

1 Kapsel 2-mal pro Tag

Art und Dauer der Anwendung:

Zum Einnehmen. Die Kapseln sollen mit ausreichend Flüssigkeit, vorzugsweise vor den Mahlzeiten, eingenommen werden. Die Anwendungsdauer von GRANUFINK® Prosta forte ist prinzipiell nicht begrenzt.

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren

Für Patienten unter 18 Jahren wird die Einnahme von GRANUFINK® Prosta forte nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge GRANUFINK® Prosta forte eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich mehr als die empfohlene Dosis von GRANUFINK® Prosta forte eingenommen haben, können die in Abschnitt 4. aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auftreten. Wenn Beschwerden auftreten setzen Sie sich mit einem Arzt in Verbindung.

Wenn Sie die Einnahme von GRANUFINK® Prosta forte vergessen haben

Setzen Sie die Behandlung mit der üblichen Dosis fort. Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Häufig (kann 1 von 10 Personen betreffen):

Leichte Magenbeschwerden

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 Wien
Österreich
Fax: +43 (0) 50 555 36207
Website: www.basg.gv.at

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST GRANUFINK® PROSTA FORTE AUFZUBEWAHREN?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blister nach „Verwendbar bis“ bzw. „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was GRANUFINK® Prosta forte enthält

Der Wirkstoff in 1 Hartkapsel ist:

500 mg Dickextrakt aus Kürbissamen (Cucurbitae semen)
Droge-Extrakt-Verhältnis 15 - 25 : 1,
Auszugsmittel: Ethanol 92 % (m/m).

Die sonstigen Bestandteile sind: Partiiell methyliertes Siliciumdioxid, kolloidal, wasserfrei, Gelatine, Eisenoxid schwarz (E 172), Eisenoxid rot (E 172) und Eisenoxid gelb (E 172).

Wie GRANUFINK® Prosta forte aussieht und Inhalt der Packung
GRANUFINK® Prosta forte sind braune Hartkapseln in PVC/PVDC-Aluminium-Bliesterpackungen.

Packungsgrößen: 20, 40, 80 oder 140 Hartkapseln.

Möglicherweise werden nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER UND HERSTELLER:

Registrierungsinhaber:

Richard Bittner AG
Reisnerstraße 55-57
1030 Wien

Vertrieb:


Omega Pharma Austria Health Care GmbH
Rennweg 17, 1030 Wien
Tel.: +43 (0)1 71 20 136-0
Fax.: +43 (0)1 71 20 136-40

Hersteller:


Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co.KG
Benzstraße 25
DE-71083 Herrenberg

Reg.Nr.: 736572

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2018.



RICHTIG ✓



FALSCH ✗